

带状疱疹ワクチン比較表

	乾燥弱毒生水痘ワクチン	シングリックス
種類	生ワクチン	不活化ワクチン
発症予防効果	51.30%	50歳以上 97.2% 70歳以上 91.3～97.9%
神経痛予防効果	66.50%	88.80%
長期予防効果	8～10年で消失 5年程度とも	8年後で84%の保有率
副反応	局所反応・発熱 水痘様発疹(1～3%)など	局所反応・筋肉痛(40%) 疲労(39%)・頭痛(33%)など
接種不相当者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・妊娠している方</li> <li>・免疫力を抑える治療をしている方</li> <li>・カナマイシン、エリスロマイシンにアレルギーがある方</li> <li>・+不活化ワクチンの項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アナフィラキシーのある方</li> <li>・明らかな発熱や急性疾患の方</li> </ul>
投与方法	皮下注射	筋肉内注射
接種回数	1回	2回(2カ月間隔、遅くとも6カ月までに)
費用(助成適応)	4,200円	10,800円/回 計2回で21,600円
メリット	価格が安い 副反応が少ない	高い効果
デメリット	予防効果がシングリックスに比べて劣る	2回接種する必要がある 注射部位の腫れが強い